

3 環境監視結果の概要及び評価

3-1 大気質

(1) 環境監視の実施状況

大気質については、大阪府が所管する一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）である佐野中学校局（炭化水素については貝塚市消防署局）のデータの活用により、二酸化窒素、浮遊粒子状物質などの環境監視が実施された。

データは、「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」の令和2年4月1日から令和3年3月31日までのデータを用いた。

佐野中学校局及び周辺の大阪府所管の一般局の位置を図3-1に示す。

なお、環境監視計画では自動車交通の影響を対象としていないが、環境の状況を確認するため、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）のデータをあわせて示す。




図3-1 大気質の測定地点

(2) 環境監視結果の概要

ア. 二酸化窒素

二酸化窒素の測定結果を表3-1に示す。佐野中学校局では、日平均値の年間98%値は0.022ppmであり、環境基準（日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下）（※）に適合していた。

また、周辺の一般局においても、日平均値の年間98%値が0.013～0.028ppmの範囲で、環境基準に適合しており、佐野中学校局の濃度レベルは周辺の一般局と同程度の状況であった。

経月変化については図3-2に示すとおり、佐野中学校局は周辺の一般局と同様の傾向を示していた。

経年変化についても図3-3に示すとおり、佐野中学校局と周辺の一般局との間に大きな違いは見られなかった。

※評価は日平均値の年間98%値を環境基準と比較して行う。

表3-1 二酸化窒素の測定結果

| 所在地 | 測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合 | | 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合 | | 日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | | 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | | 日平均値の年間98%値 | 98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数 |
|----------|---------------------------|--------|------|-------|----------|-------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|-----------------------------|
| | | (日) | (時間) | | (ppm) | (ppm) | (時間) | (%) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (日) | (%) | (ppm) |
| 泉佐野市 | 佐野中学校 | 357 | 8448 | 0.009 | 0.061 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.022 | 0 |
| 参考値（一般局） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高石市 | 高石中学校 | 357 | 8532 | 0.012 | 0.070 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.026 | 0 |
| 泉大津市 | 泉大津市役所 | 362 | 8614 | 0.012 | 0.074 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.028 | 0 |
| 岸和田市 | 岸和田中央公園 | 353 | 8435 | 0.009 | 0.066 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.022 | 0 |
| 和泉市 | 緑ヶ丘小学校 | 355 | 8440 | 0.006 | 0.049 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.014 | 0 |
| 貝塚市 | 貝塚市消防署 | 359 | 8585 | 0.008 | 0.062 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.022 | 0 |
| 泉南市 | 泉南市役所 | 364 | 8631 | 0.007 | 0.058 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.019 | 0 |
| 阪南市 | 南海団地 | 362 | 8601 | 0.005 | 0.045 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.013 | 0 |
| 参考値（自排局） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高石市 | カモドールMBS (対象:国道26号) | 338 | 8084 | 0.012 | 0.056 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.026 | 0 |
| 岸和田市 | 天の川下水ポンプ場 (対象:府道大阪臨海線) | 364 | 8645 | 0.014 | 0.073 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.028 | 0 |
| 泉佐野市 | 末広公園 (対象:国道26号) | 359 | 8534 | 0.010 | 0.064 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.027 | 0 |







図3-2 二酸化窒素濃度の経月変化（月平均値）



(注) 1. 佐野中学校局については、平成11年度～16年度までは事業主体の測定によるデータ、平成17年度以降は「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」に基づくデータを用いた。

(注) 2. 測定期間：C(樽井)は平成17年6月9日まで、C(りんくう南浜)は平成22年7月31日まで、L-1(羽倉崎)は平成17年9月21日まで、L-2(箱作)は平成22年7月31日まで。

図3-3 二酸化窒素濃度(年平均値)の経年変化

イ. 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の測定結果を表3-2に示す。佐野中学校局では、1時間値が0.20 mg/m³を超えた時間が0時間、日平均値が0.10 mg/m³を超えた日が0日、日平均値の2%除外値が0.038mg/m³となっており、短期的評価及び長期的評価による環境基準（日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m³以下）（※）に適合していた。

また、周辺の一般局においても、1時間値が0.20 mg/m³を超えた時間が0時間、日平均値が0.10 mg/m³を超えた日が0日、日平均値の2%除外値が0.032～0.039mg/m³となっており、全ての局で短期的評価及び長期的評価による環境基準に適合しており、佐野中学校局の濃度レベルは周辺の一般局と同程度の状況であった。

経月変化については図3-4に示すとおり、佐野中学校局は周辺の一般局と同様の傾向を示していた。

経年変化についても図3-5に示すとおり、佐野中学校局と周辺の一般局との間に大きな違いは見られなかった。

※【短期的評価】連続して、又は随時に行った日についての日平均値又は1時間値を環境基準と比較して評価を行う。

【長期的評価】日平均値の年間2%除外値を環境基準と比較して評価を行う。ただし、日平均値について環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、このような取り扱いをせず、環境基準を達成しなかったものとする。

表3-2 浮遊粒子状物質の測定結果

| 所在地 | 測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合 | | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 |
|----------|---------------------------|--------|------|-------|---|-----|--|-----|----------|------------|--|--|
| | | | | | (時間) | (%) | (日) | (%) | | | | |
| 泉佐野市 | 佐野中学校 | 360 | 8610 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.100 | 0.038 | ○ | 0 |
| 参考値（一般局） | | | | | | | | | | | | |
| 高石市 | 高石中学校 | 356 | 8554 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.081 | 0.033 | ○ | 0 |
| 泉大津市 | 泉大津市役所 | 361 | 8656 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.120 | 0.039 | ○ | 0 |
| 岸和田市 | 岸和田中央公園 | 362 | 8648 | 0.013 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.084 | 0.033 | ○ | 0 |
| 和泉市 | 緑ヶ丘小学校 | 362 | 8665 | 0.014 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.081 | 0.032 | ○ | 0 |
| 貝塚市 | 貝塚市消防署 | 362 | 8660 | 0.016 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.124 | 0.038 | ○ | 0 |
| 泉南市 | 泉南市役所 | 361 | 8646 | 0.013 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.143 | 0.034 | ○ | 0 |
| 阪南市 | 南海団地 | 362 | 8647 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.112 | 0.035 | ○ | 0 |
| 参考値（自排局） | | | | | | | | | | | | |
| 高石市 | カモドールMBS (対象:国道26号) | 348 | 8339 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.078 | 0.035 | ○ | 0 |
| 岸和田市 | 天の川下水ポンプ場 (対象:府道大阪臨海線) | 362 | 8663 | 0.019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.115 | 0.043 | ○ | 0 |
| 泉佐野市 | 末広公園 (対象:国道26号) | 362 | 8654 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.104 | 0.033 | ○ | 0 |







図3-4 浮遊粒子状物質濃度の経月変化（月平均値）



(注) 1. 佐野中学校局については、平成11年度～16年度までは事業主体の測定によるデータ、平成17年度以降は「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」に基づくデータを用いた。

(注) 2. 測定期間：C(樽井)は平成17年6月9日まで、C(りんくう南浜)は平成22年7月31日まで、L-1(羽倉崎)は平成17年9月21日まで、L-2(箱作)は平成22年7月31日まで。

図3-5 浮遊粒子状物質濃度(年平均値)の経年変化

(3) 評 価

- 事業者の監視局における大気質濃度は、周辺の一般局と同程度であった。
- 二酸化窒素について、佐野中学校局及び周辺の全ての一般局で環境基準に適合していた。
- 浮遊粒子状物質について、佐野中学校局及び周辺の全ての一般局で短期的評価及び長期的評価による環境基準に適合していた。

以上のことから、事業による影響は小さく、環境保全目標を満足していた。

3-2 水 質

(1) 環境監視の実施状況

生活環境項目、栄養塩類等の項目について、内部水面海域（1期空港島と2期空港島間の海域）の3地点で年2回調査が実施された。

事業者の測定地点及び周辺海域で大阪府が実施している大阪湾常時監視地点を図3-6に示す。




図3-6 水質測定地点

(2) 環境監視結果の概要

生活環境項目等の調査結果を表3-3に示す。また、pH、DO、COD、T-N及びT-Pの環境基準の適合状況を表3-4及び表3-5に示す。

いずれの項目についても、事業者の測定結果と周辺海域の府常時監視結果及び環境基準の適合状況に大きな差は認められなかった。

また、表3-6に示したとおり、過年度の調査結果と比較すると、年度ごとに多少の増減はあるものの概ね横ばい傾向にあった。

T-Nについては、令和2年度の夏季・冬季において、一部の地点において周辺海域や過年度と比べ高い濃度が見られた。

表3-3 水質の調査結果

| 項目 | | 測定地点 | | 内部水面海域 | | 周辺海域 | | | |
|---------------------------------|----|-------|---|---------------------|-------|------------------------------|---|-------|-------|
| | | | | 3地点 (N1, N2, N3) | | 4地点 (A-3, A-6, A-7, A-10) | | | |
| | | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値 |
| SS (mg/L) | 上層 | <1 | ～ | 3 | 2 | 3 | ～ | 4 | 3 |
| | 下層 | 1 | ～ | 3 | 1 | 2 | ～ | 4 | 3 |
| 透明度 (m) | | 4.3 | ～ | 10.1 | 7.2 | 3.0 | ～ | 8.7 | 6.5 |
| 水温 (°C) | 上層 | 10.1 | ～ | 28.2 | 18.6 | 10.2 | ～ | 29.7 | 19.9 |
| | 下層 | 10.4 | ～ | 23.6 | 17.0 | 10.4 | ～ | 27.1 | 18.8 |
| 塩分 | 上層 | 30.7 | ～ | 31.6 | 31.3 | 31.5 | ～ | 33.1 | 31.9 |
| | 下層 | 31.5 | ～ | 32.3 | 31.9 | 31.5 | ～ | 33.3 | 32.4 |
| pH (環境基準：7.8以上8.3以下) | 上層 | 8.1 | ～ | 8.2 | - | 7.9 | ～ | 8.3 | - |
| | 下層 | 8.0 | ～ | 8.1 | - | 8.0 | ～ | 8.3 | - |
| DO (mg/L) (環境基準：7.5mg/L以上) | 上層 | 7.9 | ～ | 10 | 9.0 | 8.1 | ～ | 10 | 9.1 |
| | 下層 | 4.4 | ～ | 9.2 | 6.8 | 6.7 | ～ | 9.6 | 8.5 |
| DO飽和度 (%) | 上層 | 112 | ～ | 122 | 116 | 107 | ～ | 141 | 120 |
| | 下層 | 63 | ～ | 105 | 83 | 101 | ～ | 123 | 109 |
| COD Mn (mg/L) (環境基準：2mg/L以下) | 上層 | 1.6 | ～ | 3.1 | 2.3 | 1.6 | ～ | 6.3 | 2.6 |
| | 下層 | 1.4 | ～ | 2.2 | 1.8 | 1.6 | ～ | 4.5 | 2.2 |
| T-N (mg/L) (環境基準：0.3mg/L以下) | 上層 | 0.21 | ～ | 0.32 | 0.27 | 0.12 | ～ | 0.22 | 0.17 |
| | 下層 | 0.19 | ～ | 0.29 | 0.24 | 0.10 | ～ | 0.21 | 0.14 |
| T-P (mg/L) (環境基準：0.03mg/L以下) | 上層 | 0.016 | ～ | 0.028 | 0.022 | 0.020 | ～ | 0.038 | 0.031 |
| | 下層 | 0.022 | ～ | 0.045 | 0.031 | 0.021 | ～ | 0.045 | 0.031 |
| クロロフィルa (μg/L) | 上層 | 0.8 | ～ | 4.5 | 2.5 | 1.1 | ～ | 4.5 | 2.4 |

(注)1. 上層：海面下1m、下層：海底面上2m。ただし、大阪府測定点A-6、A-10は海底面上5m。

(注)2. 大阪湾常時監視については、大阪府実施の測定値のうち、8月及び2月の測定値を抜粋。

表3-4 水質の環境基準値との対比（その1）

| 測定地点 項目 | | 内部水面海域 | | | 周辺海域 | | |
|-----------------------------------|----|-------------------------|-----|----------|----------------------------------|-----|----------|
| | | A海域 3地点 (N1, N2, N3) | | | A海域 4地点 (A-3, A-6, A-7, A-10) | | |
| | | 最小値 ~ 最大値 | 平均値 | m/n | 最小値 ~ 最大値 | 平均値 | m/n |
| pH (環境基準： 7.8以上8.3以下) | 上層 | 8.1 ~ 8.2 | — | 0/6(100) | 7.9 ~ 8.3 | — | 0/8(100) |
| | 下層 | 8.0 ~ 8.1 | — | 0/6(100) | 8.0 ~ 8.3 | — | 0/8(100) |
| DO (mg/L) (環境基準： 7.5mg/L以上) | 上層 | 7.9 ~ 10 | 9.0 | 0/6(100) | 8.1 ~ 10 | 9.1 | 0/8(100) |
| | 下層 | 4.4 ~ 9.2 | 6.8 | 3/6(50) | 6.7 ~ 9.6 | 8.5 | 2/8(75) |
| COD (mg/L) (環境基準： 2mg/L以下) | 上層 | 1.6 ~ 3.1 | 2.3 | 3/6(50) | 1.6 ~ 6.3 | 2.6 | 5/8(38) |
| | 下層 | 1.4 ~ 2.2 | 1.8 | 2/6(67) | 1.6 ~ 4.5 | 2.2 | 3/8(63) |

- (注) 1. 基準とは、昭和46年環境庁告示第59号「生活環境の保全に関する環境基準」のことである。
 2. m: 基準超過の検体数、n: 総検体数を示す。また、()内は適合率として、総検体数に対する基準を満たした検体数の割合(%)を示す。
 3. 上層: 海面下1m、下層: 海底面上2m。ただし、大阪府測定点A-6、A-10は海底面上5m。

表3-5 水質の環境基準値との対比（その2）

| 測定地点 項目 | | 内部水面海域 | | | 周辺海域 | | |
|-------------------------------------|----|--------------------------|-------|----------|-----------------------------------|-------|----------|
| | | II海域 3地点 (N1, N2, N3) | | | II海域 4地点 (A-3, A-6, A-7, A-10) | | |
| | | 最小値 ~ 最大値 | 平均値 | m/n | 最小値 ~ 最大値 | 平均値 | m/n |
| T-N (mg/L) (環境基準： 0.3mg/L以下) | 上層 | 0.21 ~ 0.32 | 0.27 | 2/6(67) | 0.12 ~ 0.22 | 0.17 | 0/8(100) |
| | 下層 | 0.19 ~ 0.29 | 0.24 | 0/6(100) | 0.10 ~ 0.21 | 0.14 | 0/8(100) |
| T-P (mg/L) (環境基準： 0.03mg/L以下) | 上層 | 0.016 ~ 0.028 | 0.022 | 0/6(100) | 0.020 ~ 0.038 | 0.031 | 3/8(63) |
| | 下層 | 0.022 ~ 0.045 | 0.031 | 3/6(50) | 0.021 ~ 0.045 | 0.031 | 3/8(63) |

- (注) 1. 基準とは、昭和46年環境庁告示第59号「生活環境の保全に関する環境基準」のことである。
 2. m: 基準超過の検体数、n: 総検体数を示す。また、()内は適合率として、総検体数に対する基準を満たした検体数の割合(%)を示す。
 3. 上層: 海面下1m、下層: 海底面上2m。ただし、大阪府測定点A-6、A-10は海底面上5m。

表3-6(1) 水質の経年測定結果 (COD)

| COD(mg/L) | | 夏季 | | | | | | 冬季 | | | | | |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| N1 | 上層 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.9 |
| | 下層 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 |
| N2 | 上層 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 1.6 |
| | 下層 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 1.4 |
| N3 | 上層 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| | 下層 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |

表3-6(2) 水質の経年測定結果 (DO)

| DO(mg/L) | | 夏季 | | | | | | 冬季 | | | | | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| N1 | 上層 | 9.0 | 6.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8.4 | 10 |
| | 下層 | 4.5 | 3.1 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 9.4 | 10 | 8.6 | 9.1 |
| N2 | 上層 | 9.0 | 6.2 | 7.9 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8.5 | 10 |
| | 下層 | 4.3 | 2.2 | 5.1 | 4.1 | 2.4 | 4.5 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 10 | 8.3 | 9.0 |
| N3 | 上層 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9.2 | 10 |
| | 下層 | 3.9 | 4.8 | 7.1 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.2 |

表3-6(3) 水質の経年測定結果 (T-N)

| T-N(mg/L) | | 夏季 | | | | | | 冬季 | | | | | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| N1 | 上層 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.27 |
| | 下層 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.33 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.19 |
| N2 | 上層 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.26 |
| | 下層 | 0.35 | 0.39 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 0.33 | 0.13 | 0.19 |
| N3 | 上層 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.32 |
| | 下層 | 0.32 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.12 | 0.29 | 0.33 | 0.19 | 0.30 | 0.17 | 0.14 | 0.22 |

表3-6(4) 水質の経年測定結果 (T-P)

| T-P(mg/L) | | 夏季 | | | | | | 冬季 | | | | | |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| N1 | 上層 | 0.024 | 0.031 | 0.024 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.015 | 0.021 | 0.022 | 0.014 | 0.026 | 0.016 |
| | 下層 | 0.043 | 0.065 | 0.038 | 0.041 | 0.030 | 0.038 | 0.028 | 0.020 | 0.025 | 0.014 | 0.025 | 0.022 |
| N2 | 上層 | 0.028 | 0.036 | 0.026 | 0.017 | 0.024 | 0.023 | 0.013 | 0.021 | 0.020 | 0.014 | 0.025 | 0.016 |
| | 下層 | 0.050 | 0.064 | 0.033 | 0.025 | 0.032 | 0.034 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 0.013 | 0.027 | 0.023 |
| N3 | 上層 | 0.024 | 0.032 | 0.025 | 0.013 | 0.027 | 0.023 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.015 | 0.026 | 0.028 |
| | 下層 | 0.046 | 0.058 | 0.039 | 0.037 | 0.027 | 0.045 | 0.041 | 0.025 | 0.031 | 0.019 | 0.030 | 0.025 |

(3) 評 価

- 事業者の調査結果と周辺の府監視結果及び環境基準の適合状況において、大きな差は認められず、経年変化も概ね横ばい傾向であった。

以上のことから、事業による影響は小さいものと考えられるが、T-Nについては、一部の地点において高い濃度が見られたため、引き続き状況を監視する。

3-3 底質

(1) 環境監視の実施状況

COD、強熱減量、硫化物等の項目について、内部水面海域の3地点で年2回実施された。

事業者の測定地点及び周辺海域で大阪府が実施している底質の測定地点を図3-7に示す。




図3-7 底質の測定地点

注) 大阪府実施の底質測定は、平成26年度から実施年度ごとに地点を変えて測定。
令和2年度はA-3、A-10で測定。

(2) 環境監視結果の概要

底質の測定結果を表3-7に示す。

強熱減量は3.0～10.0%、CODは乾泥1g当たり4.4～21mg、硫化物は乾泥1g当たり0.07～0.58mg、T-Nは乾泥1g当たり0.60～2.5mg、T-Pは乾泥1g当たり0.21～0.47mgの範囲にあり、周辺の府測定点の結果と大きな差は認められなかった。

また、表3-8に示したとおり、過年度の調査結果と比較しても概ね横ばい傾向にあった。

表3-7 底質の測定結果

| 測定地点 項目 | | 内部水面海域 | | 周辺海域 | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|------|--------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|
| | | 3地点 (N1, N2, N3) | | 2地点 (A-3, A-10) | | 参考 R1 1地点 (A-7) | | 参考 H30 1地点 (A-6) | |
| | | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 |
| 泥温 (°C) | | 10.5～23.3 | 17.0 | 11.0～24.3 | 17.9 | 12.0～23.9 | 18.0 | 11.5～23.0 | 17.3 |
| 強熱減量 (%) | | 3.0～10.0 | 5.6 | 8.1～11.4 | 9.5 | 9.3～9.3 | 9.3 | 8.2～8.7 | 8.5 |
| pH | | 7.7～8.1 | - | 7.2～7.7 | - | 7.8～7.9 | - | 7.9～7.9 | - |
| COD (mg/g 乾泥) | | 4.4～21 | 10 | 17～33 | 22 | 28～29 | 29 | 25～26 | 26 |
| 硫化物 (mg/g 乾泥) | | 0.07～0.58 | 0.25 | 0.20～0.35 | 0.27 | 0.64～0.83 | 0.74 | 0.31～0.37 | 0.34 |
| T-N (mg/g 乾泥) | | 0.60～2.5 | 1.4 | 2.5～2.8 | 2.7 | 2.7 | - | 2.6 | - |
| T-P (mg/g 乾泥) | | 0.21～0.47 | 0.36 | 0.36～0.40 | 0.38 | 0.61 | - | 0.55 | - |
| 粒度組成 | 礫 (2mm～) (%) | 0.0～45.7 | 17.5 | 0.3～0.6 | 0.5 | 0.5 | - | 0.3 | - |
| | 砂 (0.074～2mm) (%) | 0.9～46.4 | 24.6 | 4.8～6.0 | 5.4 | 8.1 | - | 3.5 | - |
| | シルト分以下 (~0.074mm) (%) | 24.2～99.1 | 58.0 | 93.7～94.6 | 94.2 | 91.4 | - | 96.2 | - |

注) 周辺海域のT-N、T-P、粒度組成は、年1回(8月)測定。

表3-8(1) 底質の経年測定結果 (COD)

| COD(mg/g乾泥) | 夏季 | | | | | | 冬季 | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| N1 | 4.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 5.0 | 5.3 |
| N2 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 4.4 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 4.8 |
| N3 | 18 | 16 | 17 | 17 | 25 | 21 | 15 | 20 | 11 | 19 | 8.5 | 20 |

表3-8(2) 底質の経年測定結果 (強熱減量)

| 強熱減量(%) | 夏季 | | | | | | 冬季 | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| N1 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
| N2 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 3.2 |
| N3 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 10 | 10 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 9.6 |

表3-8(3) 底質の経年測定結果 (硫化物)

| 硫化物(mg/g乾泥) | 夏季 | | | | | | 冬季 | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| N1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.31 | 0.07 | 0.28 | 0.10 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.13 |
| N2 | 0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.34 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.18 |
| N3 | 0.55 | 0.68 | 0.50 | 0.77 | 2.5 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.35 | 0.60 | 1.0 | 0.44 |

(3) 評価

- COD、T-N、T-P、硫化物のいずれについても、事業者における調査結果と周辺の府測定地点の結果との間に、大きな差は認められなかった。


以上のことから、事業による影響は小さく、環境保全目標を満足しているものと考えられる。

3-4 騒音等

(1) 環境監視の実施状況

航空機騒音については、常時測定が4地点、定期測定が3地点で年1回、6地点で年2回実施された。飛行経路及び高度については、航空機離着陸経路の4断面において、年1～2回の調査が実施された。

航空機騒音の事業者の測定地点及び大阪府が実施している測定地点を図3-8に示す。



| 地点No. | 所在地 | 地点No. | 所在地 |
|--|-------------|-------|------------------|
| ① ◎ | 泉大津市汐見町 | ⑨ ● | 田尻町りんくうポート南 |
| ② ◎ | 泉佐野市りんくう往来南 | ⑩ ● | 泉南市りんくう南浜 |
| ③ ◎ | 岬町多奈川小島 | ⑪ ● | 阪南市箱作 |
| ④ ● | 堺市南区庭代台 | ⑫ ● | 和泉市和田町 |
| ⑤ ● | 高石市高砂2丁目 | ⑬ ● | 熊取町希望が丘 |
| ⑥ ● | 忠岡町新浜3丁目 | ⑭ ▲ | 貝塚市澤（二色の浜公園） |
| ⑦ ● | 岸和田市臨海町 | ⑮ ▲ | 岬町多奈川小島（小島総合集会所） |
| ⑧ ◎ | 貝塚市二色3丁目 | | |
| 〔凡例〕 ◎騒音常時測定点 ●騒音定期測定点（④⑫⑬：年1回、⑤⑥⑦⑨⑩⑪：年2回） ▲大阪府実施航空機騒音測定地点 | | | |

図3-8 航空機騒音の測定地点

(2) 環境監視結果の概要

ア 航空機騒音

(ア) 常時測定結果

測定結果を表3-9に示す。

各測定地点におけるLdenの年間平均値は37dB未満～47dBの範囲にあり、全局で環境基準に適合していた。

経年変化については、平成25年4月1日よりLdenに移行したため過去のデータが少ないが、参考として表3-10に示したとおり旧環境基準WECPNL値で比較してみると、平成19年度のB滑走路供用以降、4地点とも概ね横ばい傾向にあった。

事業者の測定結果と近傍で府が測定した結果に、大きな差は認められなかった。

表3-9 航空機騒音の測定結果（常時測定）

| 測定地点 | Lden (dB) | | | | | | | | | | | | | 環境基準 地域 類型 | 基準値 |
|---------------|-----------|------|------|----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------------------|------|
| | 令和2年 | | | | | | | | | 令和3年 | | | 平均値 | | |
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| ① 泉大津市汐見町 | 37 | < 37 | 37 | 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | II | 62以下 |
| ② 泉佐野市りんくう往来南 | 39 | 38 | 37 | 37 | < 37 | < 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | II | 62以下 |
| ③ 岬町多奈川小島 | 48 | 46 | 46 | 45 | 44 | 46 | 48 | 48 | 46 | 46 | 45 | 48 | 47 | I | 57以下 |
| ④ 貝塚市二色3丁目 | 40 | 37 | < 37 | 37 | < 37 | < 37 | 39 | 39 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | I | 57以下 |

注1) 表中の「<37」は、Lden値が37dB未満であることを示す。

| 測定地点 | WECPNL | | | | | | | | | | | | | 平均値 |
|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 令和2年 | | | | | | | | | 令和3年 | | | | |
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| ① 泉大津市汐見町 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| ② 泉佐野市りんくう往来南 | 50 | 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | 50 | 50 | < 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | < 50 |
| ③ 岬町多奈川小島 | 60 | 58 | 58 | 57 | 56 | 57 | 60 | 60 | 58 | 58 | 57 | 60 | 59 | |
| ④ 貝塚市二色3丁目 | 51 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | 50 | 51 | < 50 | < 50 | < 50 | 50 | < 50 | |

注1) 表中の「<50」は、WECPNL値が50未満であることを示す。

表3-10 航空機騒音の経年変化（常時測定）

| 測定地点 | Lden | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| ①泉大津市 汐見町 | < 37 | < 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | < 37 |
| ②泉佐野市 りんくう往来南 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| ③岬町 多奈川小島 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 |
| ⑧貝塚市 二色3丁目 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 37 |
| 参考（大阪府が実施した航空機騒音測定結果（連続7日間測定）） | | | | | | | | |
| ⑭貝塚市 二色の浜公園 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 |
| ⑮岬町 小島総合集会所 | 48 | 51 | 51 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

注1) 表中の「<37」は、Lden値が37dB未満であることを示す。

| 測定地点 | WECPNL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |
| ①泉大津市 汐見町 | 56 | 53 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 54 | 54 | 53 | 51 | 50 | <50 | <50 | 50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 50 | <50 |
| ②泉佐野市 りんくう往来南 | 50 | 50 | 53 | 51 | 51 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 52 | 50 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | <50 |
| ③岬町 多奈川小島 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 62 | 61 | 61 | 60 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | |
| ⑧貝塚市 二色3丁目 | / | / | / | / | 55 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 53 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | <50 | |
| 参考（大阪府が実施した航空機騒音測定結果（連続7日間測定）） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑭貝塚市 | 二色の浜埋立地 | 59 | 59 | 61 | 62 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 二色の浜公園 | / | / | / | / | 54 | 53 | 57 | 54 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
| ⑮岬町 | 小島総合集会所 | 55 ^{※1} | 63 | 65 | 65 | 66 | 61 | 63 | 64 ^{※2} | 62 | 62 | 61 | 60 | 62 | 60 | 61 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 59 | 59 | 58 | 57 | 58 |

注1) 表中の「<50」は、WECPNL値が50未満であることを示す。

注2) ⑧貝塚市二色3丁目は平成10年12月3日から常時測定。

注3) ③岬町多奈川小島の平成24年度測定データは、長期間(9月30日から11月10日まで)欠測あり。

※1 測定地点:府立水産試験場(岬町) ※2 測定地点:小島児童遊園

(イ) 定期測定結果

測定結果を表3-11に示す。

各測定地点におけるLdenの平均値は37dB未満～37dBの範囲にあり、いずれの地点においても環境基準に適合していた。

経年変化については、平成25年4月1日よりLdenに移行したため過去のデータが少ないが、参考として表3-12に示したとおり旧環境基準WECPNL値で比較してみると、どの地点も概ね横ばい傾向にあった。

表3-11 航空機騒音の測定結果（定期測定）

| 測定地点 | Lden (dB) | | | | | 備考 |
|---------------|-----------|------|------|----------|------|-----------------|
| | 令和2年 | | 平均値 | 環境基準 | | |
| | 6月 | 12月 | | 地域 類型 | 基準値 | |
| ④ 堺市南区庭代台 | / | < 37 | < 37 | I | 57以下 | 各月の調査日数は7日間である。 |
| ⑤ 高石市高砂2丁目 | — | — | — | — | — | |
| ⑥ 忠岡町新浜3丁目 | — | — | — | II | 62以下 | |
| ⑦ 岸和田市臨海 | < 37 | < 37 | < 37 | II | 62以下 | |
| ⑨ 田尻町りんくうポート南 | < 37 | 38 | 37 | II | 62以下 | |
| ⑩ 泉南市りんくう南浜 | < 37 | < 37 | < 37 | II | 62以下 | |
| ⑪ 阪南市箱作 | < 37 | < 37 | < 37 | I | 57以下 | |
| ⑫ 和泉市和田町 | / | < 37 | < 37 | II | 62以下 | |
| ⑬ 熊取町希望が丘 | / | < 37 | < 37 | I | 57以下 | |

注1) 表中の「<37」は、Lden値が37dB未満であることを示す。

注2) 表中の「—」は、暗騒音より10dB以上の最大騒音レベル(ピークレベル)が検出できなかった事を示す。

注3) 表中の「/」は、調査がなかったことを示す。

| 測定地点 | WECPNL | | | 備考 |
|---------------|--------|------|------|-----------------|
| | 令和2年 | | 平均値 | |
| | 6月 | 12月 | | |
| ④ 堺市南区庭代台 | / | < 50 | < 50 | 各月の調査日数は7日間である。 |
| ⑤ 高石市高砂2丁目 | — | — | — | |
| ⑥ 忠岡町新浜3丁目 | — | — | — | |
| ⑦ 岸和田市臨海 | < 50 | < 50 | < 50 | |
| ⑨ 田尻町りんくうポート南 | < 50 | < 50 | < 50 | |
| ⑩ 泉南市りんくう南浜 | < 50 | < 50 | < 50 | |
| ⑪ 阪南市箱作 | < 50 | < 50 | < 50 | |
| ⑫ 和泉市和田町 | / | < 50 | < 50 | |
| ⑬ 熊取町希望が丘 | / | < 50 | < 50 | |

注1) 表中の「<50」は、WECPNL値が50未満であることを示す。

注2) 表中の「—」は、暗騒音より10dB以上のピークレベルが検出できなかった事を示す。

注3) 表中の「/」は、調査がなかったことを示す。

表3-12 航空機騒音の経年変化（定期測定）

| 測定地点 | Lden | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| ④堺市南区庭代台 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 |
| ⑤高石市高砂2丁目 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | — |
| ⑥忠岡町新浜3丁目 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | 39 | < 37 | < 37 | — |
| ⑦岸和田市臨海町 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 |
| ⑨田尻町りんくうポート南 | 42 | 38 | 37 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 |
| ⑩泉南市りんくう南浜 | 38 | < 37 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | < 37 |
| ⑪阪南市箱作 | 38 | 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | < 37 | < 37 |
| ⑫和泉市和田町 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 |
| ⑬熊取町希望が丘 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 | < 37 |

注1) 表中の「<37」は、Lden値が37dB未満であることを示す。

注2) 表中の「—」は、暗騒音より10dB以上の最大騒音レベル(ピークレベル)が検出できなかった事を示す。

| 測定地点 | WECPNL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|
| | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| ④堺市 築港新町 南区庭代台 | <50 | <50 | <50 | <50 | — | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 平成10年12月から測定地点を変更 |
| | <50 | <50 | 51 | 51 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
| ⑤高石市 高砂3丁目 高砂2丁目 | <50 | <50 | 51 | 51 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 平成10年12月から測定地点を変更 | |
| | 55 | 53 | 57 | 55 | 55 | 53 | 52 | 53 | 52 | 51 | 53 | 54 | 52 | 50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | — | |
| ⑦岸和田市 地藏浜町 臨海町 | 55 | 55 | 54 | 57 | 59 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 平成10年12月から測定地点を変更 | |
| | 55 | 55 | 54 | 57 | 59 | 57 | 54 | 55 | 54 | 55 | 53 | 53 | 52 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
| ⑧貝塚市 二色3丁目 | 55 | 57 | 53 | 56 | 54 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 平成10年9月まで | |
| ⑨田尻町 りんくうポート南 | 57 | 54 | 52 | 55 | 54 | 54 | 56 | 53 | 54 | 55 | 55 | 52 | 55 | 53 | 50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 52 | <50 | <50 | 52 | 51 | 51 | <50 | <50 |
| ⑩泉南市 りんくう南浜 | 56 | 53 | 54 | 59 | 58 | 58 | 59 | 57 | 58 | 57 | 56 | 51 | 58 | 57 | 53 | 51 | 53 | 51 | <50 | <50 | <50 | 54 | 54 | 53 | 50 | 54 | <50 | |
| ⑪阪南市 箱作 | 53 | 52 | 52 | 56 | 55 | 54 | 56 | 52 | 53 | 54 | 54 | <50 | 55 | 53 | 53 | <50 | 51 | 50 | <50 | <50 | 51 | 53 | 52 | 50 | 51 | <50 | <50 | |
| ⑫和泉市 府中町 和田町 | — | — | <50 | <50 | <50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 平成10年12月から測定地点を変更 | |
| | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
| ⑬熊取町 野田 大久保 希望が丘 | — | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 平成7年6月まで | |
| | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 平成7年12月～平成10年6月まで | |
| | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | — | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 平成10年9月から | |

注1) 表中の「<50」は、WECPNL値が50未満であることを示す。

注2) 表中の「—」は、暗騒音より10dB以上のピークレベルが検出できなかった事を示す。

注3) 各地点の調査頻度(年間調査回数)の推移は右のとおり。

| | ~H14 | H15 ~16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 ~26 | H27 ~ R2 |
|-------|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------|
| ④ | | 2 | | 1 | 3 | | | | 1 |
| ⑤ | | 2 | | 1 | 3 | | | | 1 |
| ⑥⑦⑨⑩⑪ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ⑫⑬ | | 2 | | 1 | 3 | | | | 1 |

イ 飛行経路及び高度

航空機の経路及び高度の調査実施状況を表3-13に示す。小島断面（離陸、着陸）、高石断面（着陸）及び岸和田断面（離陸、着陸）において年1回、貝塚断面（離陸、着陸）において年2回実施された。それぞれの断面における調査結果を図3-9(1)～(6)に示す。

着陸では、直線進入する南西からの場合（小島断面）、旋回進入する北東からの場合（高石断面及び岸和田断面）とも、水平方向、垂直方向ともに大きなばらつきは見られなかった。B滑走路着陸の場合は、A滑走路着陸経路の2000m程度沖側に着陸経路が確認された。

飛行高度は、陸上ルート入口で高度が最も低くなる貝塚断面においてすべて8,000フィート以上であり、AIP（航空路誌）に規定されている最低高度である8,000フィート以上を確保していた。

表3-13 調査断面と調査月（経路及び高度）

| No. | 調査断面 | 区分 | R2.6月 | R2.7月 | R2.10月 | R2.12月 |
|-----|-------------|----|-------|-------|--------|--------|
| 1 | 小島断面 | 離陸 | | | ○ | |
| 2 | 同上 | 着陸 | | | ○ | |
| 3 | 高石断面及び岸和田断面 | 着陸 | | ○ | | |
| 4 | 岸和田断面 | 離陸 | | ○ | | |
| 5 | 貝塚断面 | 離陸 | ○ | | | ○ |
| 6 | 同上 | 着陸 | ○ | | | ○ |

(3) 評価

航空機騒音については、全ての測定局及び測定地点で環境基準に適合しており、経年変化も概ね横ばい傾向にあることから、環境保全目標を満足していた。

観測日：令和2年10月1日～3日




図3-9(1) 航空機飛行経路・高度の観測結果

観測日：令和2年10月1日～3日




図3-9(2) 航空機飛行経路・高度の観測結果

観測日：令和2年7月1日～3日




図3-9(3) 航空機飛行経路・高度の観測結果

観測日：令和2年7月1日～3日




図3-9(4) 航空機飛行経路・高度の観測結果

観測日：令和2年6月1日～7日

観測日：令和2年12月1日～7日




図3-9(5) 航空機飛行経路・高度の観測結果

観測日：令和2年6月1日～7日

観測日：令和2年12月1日～7日




図3-9(6) 航空機飛行経路・高度の観測結果

3-5 海域生物

(1) 環境監視の実施状況

内部水面海域の3地点において底生生物を年2回調査した。

調査地点を図3-10に示す。




図3-10 海域生物の調査地点

(2) 環境監視結果の概要

調査結果を表3-14に示す。

確認された底生生物の総種類数は120種で、季節別では8月が85種、2月が80種であった。主要種はホトトギスガイ、ミズヒキゴカイ、カタマガリギボシイソメ等で、いずれも内湾・沿岸域で普通に見られる種であった。

表3-15に示す底生生物の経年出現種類数では、夏・冬ともに平成18年度の調査開始以降で最も出現種類数が多かった。

また、表3-16に示すとおり、主要種は各年度ともホトトギスガイ、カタマガリギボシイソメ等内湾・沿岸域で普通に見られる種で構成されており、経年的に大きな変化は見られなかった。

表3-14 底生生物の調査結果（内部水面海域）

| 調査月 | | 8月 | | | 2月 | | | | |
|----------------|------------|-------------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 調査日 | | 令和2年8月13日 | | | 令和3年2月13日 | | | | |
| 調査点数 | | 3 | | | 3 | | | | |
| 区分 | | 最小値 | ～ | 最大値 | 総種類数 | 最小値 | ～ | 最大値 | 総種類数 |
| 種類数 | 軟体動物門 [45] | 1 | ～ | 22 | 27 | 3 | ～ | 27 | 32 |
| | 環形動物門 [48] | 1 | ～ | 31 | 36 | 6 | ～ | 24 | 34 |
| | 節足動物門 [15] | 1 | ～ | 6 | 10 | 1 | ～ | 6 | 9 |
| | その他 [12] | 3 | ～ | 7 | 12 | 0 | ～ | 4 | 5 |
| | 合計 [120] | 6 | ～ | 65 | 85 | 10 | ～ | 59 | 80 |
| 区分 | | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値 |
| 個体数 | 軟体動物門 | 2 | ～ | 814 | 281 | 5 | ～ | 134 | 64 |
| | 環形動物門 | 2 | ～ | 707 | 291 | 9 | ～ | 234 | 103 |
| | 節足動物門 | 1 | ～ | 10 | 7 | 1 | ～ | 86 | 33 |
| | その他 | 4 | ～ | 17 | 12 | 0 | ～ | 9 | 5 |
| | 合計 | 9 | ～ | 1547 | 591 | 15 | ～ | 460 | 205 |
| 個体組成比 (%) | 軟体動物門 | 12.4 | ～ | 52.6 | 47.5 | 29.1 | ～ | 37.6 | 31.2 |
| | 環形動物門 | 22.2 | ～ | 75.2 | 49.2 | 47.5 | ～ | 60.0 | 50.2 |
| | 節足動物門 | 0.6 | ～ | 11.1 | 1.2 | 6.7 | ～ | 18.7 | 16.1 |
| | その他 | 1.0 | ～ | 44.4 | 2.1 | 0.0 | ～ | 6.4 | 2.4 |
| 湿重量 (g) | 軟体動物門 | 0.01 | ～ | 27.88 | 9.46 | 0.02 | ～ | 2.37 | 0.93 |
| | 環形動物門 | 0.01 | ～ | 9.60 | 4.57 | 0.20 | ～ | 4.84 | 1.99 |
| | 節足動物門 | + | ～ | 0.03 | 0.02 | + | ～ | 0.17 | 0.06 |
| | その他 | 1.44 | ～ | 9.87 | 6.74 | - | ～ | 6.81 | 2.28 |
| 合計 | 9.89 | ～ | 38.94 | 20.79 | 0.22 | ～ | 8.15 | 5.26 | |
| 主要種 個体数 (%) | | ホトトギスガイ 217 (36.8) | | | ミズヒキゴカイ 31 (14.9) | | | | |
| | | ミズヒキゴカイ 71 (12.0) | | | カタマガリギボシイソメ 22 (10.9) | | | | |
| | | ニセタマガシフサゴカイ 53 (9.0) | | | ドロソコエビ属の一種 15 (7.3) | | | | |
| | | Eunice属の一種 38 (6.4) | | | ケシトリガイ 13 (6.2) | | | | |
| | | フサゴカイ科の一種 26 (4.3) | | | エンボソコエビ属の一種 13 (6.2) | | | | |

注1) 個体数、湿重量は0.15㎡当たりで示す。湿重量の「-」は生物が確認されなかったことを、「+」は0.01g未満の生物が確認されたことを示す。

注2) 主要種は個体数の上位5種を示す。

表3-15 底生生物の経年出現種類数（内部水面海域）

| 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 春(5月) | 29 | 47 | 45 | 51 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 夏(8月) | 37 | 38 | 35 | 34 | 39 | 58 | 38 | 35 | 26 | 78 | 45 | 52 | 70 | 49 | 85 |
| 秋(11月) | 39 | 32 | 47 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 冬(2月) | 47 | 46 | 51 | 32 | 42 | 51 | 44 | 64 | 56 | 67 | 58 | 61 | 78 | 59 | 80 |

注1) 平成18年度より3地点で調査。

注2) 平成22年度は年3回調査。

注3) 平成23年度から年2回調査。

表3-16 底生生物の主要種の経年変化（内部水面海域）

| 年度 | H28 | | H29 | | H30 | | R1 | | R2 | |
|----|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 主要種 | 個体数組成比(%) | 主要種 | 個体数組成比(%) | 主要種 | 個体数組成比(%) | 主要種 | 個体数組成比(%) | 主要種 | 個体数組成比(%) |
| 8月 | カタマカリギボシイソメ | 24.8 | カタマカリギボシイソメ | 28.5 | カタマカリギボシイソメ | 17.4 | ホトトギスガイ | 16.8 | ホトトギスガイ | 36.8 |
| | ナガオタケフシゴカイ | 24.1 | ホトトギスガイ | 22.0 | フサゴカイ科の一種 | 15.2 | カタマカリギボシイソメ | 4.8 | ミズヒキゴカイ | 12.0 |
| | ミズヒキゴカイ | 9.0 | シズクガイ | 15.0 | シズクガイ | 9.5 | ドロヨコエビ | 2.7 | ニセタマガシフサゴカイ | 9.0 |
| | シズクガイ | 7.5 | ミズヒキゴカイ | 8.6 | ドロヨコエビ | 5.7 | シズクガイ | 2.1 | Eunice属の一種 | 6.4 |
| | フサゴカイ科の一種 | 3.8 | ナガオタケフシゴカイ | 2.2 | ミズヒキゴカイ | 4.7 | Terebellides属の一種 | 1.4 | フサゴカイ科の一種 | 4.3 |
| | | ニセタマガシフサゴカイ | 2.2 | | | | | | | |
| 2月 | ホトトギスガイ | 39.2 | カタマカリギボシイソメ | 32.9 | カタマカリギボシイソメ | 18.0 | ホトトギスガイ | 9.3 | ミズヒキゴカイ | 14.9 |
| | カタマカリギボシイソメ | 20.5 | ミズヒキゴカイ | 7.9 | ホトトギスガイ | 15.0 | ドロヨコエビ | 3.3 | カタマカリギボシイソメ | 10.9 |
| | シノハネエラスピオ(旧和名:ヨツパネスピオA型) | 3.5 | タケフシゴカイ科の一種 | 7.9 | ツマベニクダタマガイ | 4.8 | ユンボソコエビ科の一種 | 2.4 | ドロソコエビ属の一種 | 7.3 |
| | クシカギゴカイ | 3.5 | ナガオタケフシゴカイ | 4.6 | Eunice属の一種 | 3.6 | ドロソコエビ属の一種 | 2.0 | ケントリガイ | 6.2 |
| | ナガオタケフシゴカイ | 2.9 | シズクガイ | 4.6 | タニシツボ | 3.2 | ケントリガイ | 1.6 | ユンボソコエビ属の一種 | 6.2 |
| | | | | | | | | | | |

注) 主要種は個体数の上位5種を示す。

(3) 評価

主要種は、内湾・沿岸域で普通に見られる種が確認され、出現種類についても経年的に大きな変化が見られなかったことから、事業による海域生物への影響は小さく、環境保全目標を満足していると考えられる。

3-6 評価のまとめ

- 大気質については、事業者監視局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の測定結果は環境基準に適合しており、濃度レベルは周辺の一般局と同程度であった。
- 水質については、事業者の調査結果と周辺の府監視結果に大きな差は認められなかった。
- 底質については、事業者の調査結果と周辺の府監視結果に大きな差は認められなかった。
- 騒音については、全ての測定局及び測定地点で環境基準に適合していた。
- 海域生物については、内湾・沿岸域で普通に見られる種が確認された。
- 以上の環境監視結果から、環境基準の達成と維持に支障を及ぼさない、環境に著しい変化を生じさせないなど、環境保全目標を満足していると考えられる。