

患者調査 (n=470) : 問 3 (後発医薬品の使用経験) × 問 2 (使用の意向)

| | | 使用経験 (先発医薬品との違い) | | | | | | | | | | | | | | 合計 | |
|------|---------------|------------------|-------|-----------|-------|---------------|------|-----------------|-------|--------|-------|--------|------|-----|------|-----|--------|
| | | 初めからジェネリックを使用 | | 特に違いはなかった | | 先発医薬品と比べて良かった | | 先発医薬品と比べて良くなかった | | 使用経験なし | | 使用経験不明 | | 無回答 | | | |
| 使用意向 | 使いたい | 23 | 4.9% | 84 | 17.9% | 3 | 0.6% | 6 | 1.3% | 9 | 1.9% | 5 | 1.1% | 5 | 1.1% | 135 | 28.7% |
| | こだわらない | 10 | 2.1% | 43 | 9.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.4% | 7 | 1.5% | 5 | 1.1% | 1 | 0.2% | 68 | 14.5% |
| | 場合によっては使いたくない | 38 | 8.1% | 80 | 17.0% | 0 | 0.0% | 32 | 6.8% | 20 | 4.3% | 12 | 2.6% | 3 | 0.6% | 185 | 39.4% |
| | 使いたくない | 9 | 1.9% | 9 | 1.9% | 0 | 0.0% | 15 | 3.2% | 20 | 4.3% | 9 | 1.9% | 1 | 0.2% | 63 | 13.4% |
| | わからない | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 5 | 1.1% | 7 | 1.5% | 0 | 0.0% | 15 | 3.2% |
| | 無回答 | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 4 | 0.9% |
| 合計 | | 81 | 17.2% | 220 | 46.8% | 3 | 0.6% | 56 | 11.9% | 61 | 13.0% | 39 | 8.3% | 10 | 2.1% | 470 | 100.0% |