資料２－４

病院医師調査（n=198）：問５－１（不安の内容）×問２（勧めるときに考慮する事項）

		不安の内容											
		効果の違い		添加剤が異なる為、品質が同等でない		先発医薬品にはない副作用が出る可能性がある		情報不足		性状・使用感が異なる		不安なし	
勧めるときに考慮する事項	自己負担	33	16.7%	26	13.1%	23	11.6%	23	11.6%	19	9.6%	30	15.2%
	薬剤の効能（適応症）	23	11.6%	15	7.6%	18	9.1%	18	9.1%	13	6.6%	19	9.6%
	先発品との違いを気にする者	17	8.6%	14	7.1%	11	5.6%	14	7.1%	14	7.1%	16	8.1%
	疾患の違い	11	5.6%	10	5.1%	8	4.0%	9	4.5%	8	4.0%	8	4.0%
	疾患の重症度	8	4.0%	5	2.5%	5	2.5%	3	1.5%	4	2.0%	5	2.5%
	初回診察時の患者の反応	4	2.0%	5	2.5%	3	1.5%	4	2.0%	5	2.5%	8	4.0%
	後発医薬品の説明に長時間要する	4	2.0%	5	2.5%	3	1.5%	2	1.0%	2	1.0%	2	1.0%
	年齢	3	1.5%	1	0.5%	3	1.5%	1	0.5%	3	1.5%	4	2.0%
	性別		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

診療所調査（n=223）：問７－１（不安の内容）×問４（勧めるときに考慮する事項）

		不安の内容											
		効果の違い		添加剤が異なる為、品質が同等でない		先発医薬品にはない副作用が出る可能性がある		情報不足		性状・使用感が異なる		不安なし	
勧めるときに考慮する事項	自己負担	32	14.3%	21	9.4%	21	9.4%	19	8.5%	15	6.7%	36	16.1%
	薬剤の効能（適応症）	27	12.1%	18	8.1%	17	7.6%	14	6.3%	13	5.8%	22	9.9%
	先発品との違いを気にする者	21	9.4%	15	6.7%	16	7.2%	11	4.9%	9	4.0%	17	7.6%
	初回診察時の患者の反応	10	4.5%	5	2.2%	4	1.8%	5	2.2%	4	1.8%	8	3.6%
	疾患の違い	9	4.0%	3	1.3%	4	1.8%	4	1.8%	2	0.9%	6	2.7%
	疾患の重症度	9	4.0%	5	2.2%	6	2.7%	3	1.3%	3	1.3%	5	2.2%
	後発医薬品の説明に長時間要する	9	4.0%	7	3.1%	6	2.7%	5	2.2%	4	1.8%		0.0%
	年齢	5	2.2%	5	2.2%	5	2.2%	4	1.8%	4	1.8%	3	1.3%
	性別	1	0.4%	1	0.4%	1	0.4%	1	0.4%	1	0.4%		0.0%