

## &lt;錠剤・カプセル剤・顆粒剤・細粒剤&gt;

改訂前	改訂後
<p>【効能又は効果】</p> <p>次の疾患の腫脹の緩解</p> <p><u>慢性副鼻腔炎、歯槽膿漏症（炎症型）</u></p> <p>痰の切れが悪く、喀出回数の多い下記疾患の喀痰喀出困難</p> <p>気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症</p> <p><u>小手術時の術中術後出血（歯科、泌尿器科領域）</u></p> <p>【用法及び用量】</p> <p><u>慢性副鼻腔炎の腫脹の緩解、痰の切れが悪く、喀出回数の多い気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症の喀痰喀出困難、小手術時の術中術後出血（歯科、泌尿器科領域）の場合</u></p> <p>通常、成人は1日リゾチーム塩酸塩として、60～270mg（力価）を3回に分けて経口投与する。</p> <p><u>歯槽膿漏症（炎症型）の腫脹の緩解の場合</u></p> <p>通常、成人は1日リゾチーム塩酸塩として、180～270mg（力価）を3回に分けて経口投与する。</p> <p><u>この場合、症状に応じ投与前又は投与中に歯石除去、洗淨或いは薬物局所投与等の局所処置を施す。</u></p> <p>本剤の体内での作用機序はなお解明されない点も多く、また、用量・効果の関係も必ずしも明らかにされていない。したがって漫然と投与すべきではない。</p>	<p>【効能又は効果】</p> <p>次の疾患の腫脹の緩解</p> <p>慢性副鼻腔炎</p> <p>痰の切れが悪く、喀出回数の多い下記疾患の喀痰喀出困難</p> <p>気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症</p> <p>【用法及び用量】</p> <p>通常、成人は1日リゾチーム塩酸塩として、60～270mg（力価）を3回に分けて経口投与する。</p> <p>本剤の体内での作用機序はなお解明されない点も多く、また、用量・効果の関係も必ずしも明らかにされていない。したがって漫然と投与すべきではない。</p>

(下線部削除)

## &lt;シロップ剤&gt;

改訂前	改訂後
<p>【効能又は効果】</p> <p>痰の切れが悪く、喀出回数の多い下記疾患の喀痰喀出困難</p> <p>気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症</p> <p>次の疾患の腫脹の緩解</p> <p>慢性副鼻腔炎</p> <p><u>小手術時の術中術後出血（歯科、泌尿器科領域）</u></p>	<p>【効能又は効果】</p> <p>痰の切れが悪く、喀出回数の多い下記疾患の喀痰喀出困難</p> <p>気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症</p> <p>次の疾患の腫脹の緩解</p> <p>慢性副鼻腔炎</p>

(下線部削除。シロップ剤については、用法及び用量の変更なし。)

※【効能又は効果】及び【用法及び用量】は、各品目の添付文書を確認すること。