

〈令和7年6月30日までのデータ〉

ハスモンヨトウ フェロモントラップ



蛾のオス成虫がメス成虫の出す性フェロモンに誘引される特徴を利用して発生量を調査しています。誘殺虫数が平年より著しく増加した場合、その後に幼虫が多発して被害を受けることがあります。

ハスモンヨトウは、大豆、さといも、えだまめ、キャベツ、なすなど野菜・花き類全般を加害します。

※ハスモンヨトウについては、[ヨトウムシ類の見分け方と防除](#)を参考にしてください。


〈調査地点〉羽曳野市、枚方市、八尾市、富田林市、堺市、岸和田市、泉佐野市

誘殺虫数(旬別) ※縦軸の目盛りはグラフごとに異なる場合がありますのでご注意ください。




〈令和7年6月30日までのデータ〉


八尾	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				17	32	32	18	37	50															
平年値				4	20	23	26	38	62	88	85	101	103	118	111	97	102	106	88	88	102	69	89	76



富田林	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				4	14	23	42	74	80															
平年値				3	3	5	9	20	26	41	45	55	64	75	92	103	95	89	88	92	92	72	84	56




堺	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				55	98	150	117	90	89															
平年値				28	38	53	55	83	88	109	96	93	106	109	116	115	98	114	99	108	100	82	88	55



〈令和7年6月30日までのデータ〉

岸和田	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				79	104	147	136	128	114															
平年値				27	44	40	58	86	79	97	95	106	99	101	106	104	114	117	112	106	109	90	86	71



泉佐野	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				27	122	102	119	96	115															
平年値				15	26	30	41	51	61	76	80	83	83	79	88	88	97	124	105	100	111	86	86	51

