

〈令和7年6月30日までのデータ〉

オオタバコガ フェロモントラップ


蛾のオス成虫がメス成虫の出す性フェロモンに誘引される特徴を利用して発生量を調査しています。誘殺虫数が平年より著しく増加した場合、その後に幼虫が多発して被害を受けることがあります。

オオタバコガは、きく、トマト、水なす、キャベツなど野菜・花き類全般を加害します。


〈調査地点〉羽曳野市、枚方市、八尾市、富田林市、岸和田市、泉佐野市

誘殺虫数(旬別) ※縦軸の目盛りはグラフごとに異なる場合がありますのでご注意ください。

羽曳野	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7	1	5	30	76	58	65	12	33	163															
平年値	0	1	3	12	10	7	3	11	38	32	26	31	25	20	22	23	37	53	66	63	49	22	14	3



枚方	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				16	19	32	7	22	56															
平年値				3	3	1	1	4	8	10	6	9	10	9	12	13	8	20	21	18	14	12	11	2



〈令和7年6月30日までのデータ〉

泉佐野	4			5			6			7			8			9			10			11					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
R7				47	53	21	10	69	162																		
平年値				13	15	13	8	32	66	73	54	61	62	52	44	55	71	75	79	84	97	67	39	17			

