

〈令和7年7月31日までのデータ〉

オオタバコガ フェロモントラップ


蛾のオス成虫がメス成虫の出す性フェロモンに誘引される特徴を利用して発生量を調査しています。誘殺虫数が平年より著しく増加した場合、その後に幼虫が多発して被害を受けることがあります。

オオタバコガは、きく、トマト、水なす、キャベツなど野菜・花き類全般を加害します。


〈調査地点〉羽曳野市、枚方市、八尾市、富田林市、岸和田市、泉佐野市

誘殺虫数(旬別) ※縦軸の目盛りはグラフごとに異なる場合がありますのでご注意ください。

羽曳野	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7	1	5	30	76	58	65	12	33	163	138	119	80												
平年値	0	1	3	12	10	7	3	11	38	32	26	31	25	20	22	23	37	53	66	63	49	22	14	3




校方	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				16	19	32	7	22	56	89	32	26												
平年值				3	3	1	1	4	8	10	6	9	10	9	12	13	8	20	21	18	14	12	11	2




〈令和7年7月31日までのデータ〉


八尾	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				29	71	68	13	73	152	158	107	108												
平年値				5	28	13	11	33	66	82	63	80	78	57	53	56	63	67	69	66	66	24	37	14



富田林	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				4	2	1	0	1	0	0	0	0												
平年値				3	3	3	5	3	3	3	2	2	1	3	1	2	2	3	13	4	5	3	0	1



岸和田	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				110	213	131	43	51	84	89	60	37												
平年値				20	17	15	14	30	56	65	49	48	32	34	28	37	47	54	67	77	84	68	47	21



〈令和7年7月31日までのデータ〉

泉佐野	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				47	53	21	10	69	162	175	113	91												
平年値				13	15	13	8	32	66	73	54	61	62	52	44	55	71	75	79	84	97	67	39	17

