

〈令和7年7月31日までのデータ〉

シロイチモジヨトウ フェロモントラップ

蛾のオス成虫がメス成虫の出す性フェロモンに誘引される特徴を利用して発生量を調査しています。
誘殺虫数が平年より著しく増加した場合、その後に幼虫が多発して被害を受けることがあります。


シロイチモジヨトウは、ねぎ、きく、ケイトウなど野菜・花き類全般を加害します。

※シロイチモジヨトウについては、[ヨトウムシ類の見分け方と防除](#)、
[シロイチモジヨトウ生態と防除対策](#)を参考にしてください。


〈調査地点〉羽曳野市、枚方市、富田林市、堺市、岸和田市、泉佐野市

誘殺虫数(旬別) ※縦軸の目盛りはグラフごとに異なる場合がありますのでご注意ください。

羽曳野	4			5			6			7			8			9			10			11		
R7	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
平年値	0	1	2	5	6	12	24	27	28	35	37	51	47	38	46	49	62	78	72	42	45	18	8	3




枚方	4			5			6			7			8			9			10			11		
R7	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
平年値				1	3	6	7	9	10	9	8	13	14	13	19	17	23	37	26	10	8	9	6	7




〈令和7年7月31日までのデータ〉


富田林	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				4	8	12	6	15	41	9	25	15												
平年値				1	4	10	8	5	8	6	10	10	12	13	21	19	21	20	8	4	7	3	4	1



堺	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				29	51	67	167	140	95	153	151	209												
平年値				10	30	52	51	59	65	79	75	90	85	93	99	95	112	134	146	129	96	48	46	21



岸和田	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				44	41	89	227	203	130	136	142	180												
平年値				24	30	63	91	118	96	127	128	143	126	153	161	156	153	181	156	132	103	70	65	38



〈令和7年7月31日までのデータ〉

泉佐野	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				9	54	45	72	79	84	75	61	98												
平年値				5	11	15	23	39	34	51	52	53	46	78	72	58	112	163	145	113	86	33	23	9

