

〈令和8年6月のデータ〉

チャバネアオカメムシ フェロモントラップ

集合フェロモンを利用して発生量を調査しています。誘殺虫数が平年より増加した場合、果樹園への成虫飛来が多く、吸汁被害が発生することがあります。

チャバネアオカメムシは、もも、うめ、かき、発生量が多い場合にはぶどう、みかんなどを加害します。


※チャバネアオカメムシについては以下の資料も参考にしてください。

[果樹カメムシ類 生態と防除対策](#)

<調査地点>羽曳野市、岸和田市、河内長野市
誘殺虫数(旬別) ※縦軸の目盛りはグラフごとに異なりますのでご注意ください。


6月下旬 までのデータ

羽曳野	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8	0	0	1	12	493	164	23	290	404															
平年値	0	0	3	9	72	36	23	91	152	163	193	271	137	32	9	2	1	1	1	0	0	0	0	0



6月下旬 までのデータ

岸和田	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				22	59	55	22	31	45															
平年値				7	7	6	7	12	22	41	29	50	41	15	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0



〈令和8年6月のデータ〉

6月下旬 までのデータ

河内長野	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				0	1	1	7	24	34															
平年値				2	4	5	4	12	27	45	69	117	99	42	13	3	2	1	1	1	0	0	0	0

