

〈令和8年6月のデータ〉

シロイチモジヨトウ フェロモントラップ

蛾のオス成虫がメス成虫の出す性フェロモンに誘引される特徴を利用して発生量を調査しています。
誘殺虫数が平年より著しく増加した場合、その後に幼虫が多発して被害を受けることがあります。

シロイチモジヨトウは、キャベツ、しゅんぎく、なす、ねぎ、きく、ケイトウなど野菜・花き類全般を加害します。

※シロイチモジヨトウについては以下の資料も参考にしてください。

[ヨトウムシ類の見分け方と防除](#)


[シロイチモジヨトウ 生態と防除対策](#)

<調査地点>羽曳野市、枚方市、富田林市、堺市、岸和田市、泉佐野市

誘殺虫数(旬別) ※縦軸の目盛りはグラフごとに異なりますのでご注意ください。


6月下旬 までのデータ

羽曳野	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8	0	1	13	13	13	82	152	46	58															
平年値	1	2	3	5	6	13	25	29	31	40	45	61	64	63	64	68	95	116	138	97	59	24	11	5



6月下旬 までのデータ


枚方	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				5	17	49	83	30	18															
平年値				1	4	7	9	13	13	17	12	18	19	17	25	21	26	43	41	27	11	10	7	8



〈令和8年6月のデータ〉


6月下旬 までのデータ

富田林	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				5	8	47	57	10	28															
平年値				2	4	10	8	6	12	6	13	12	17	17	24	21	23	24	13	8	9	4	4	1




6月下旬 までのデータ

堺	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				0	50	281	109	109	220															
平年値				12	31	55	67	72	70	92	88	109	93	107	113	112	117	162	174	141	109	57	52	29



6月下旬 までのデータ

岸和田	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				29	40	281	170	142	272															
平年値				29	33	70	113	137	105	139	141	156	133	160	166	164	161	198	171	152	112	77	66	42



〈令和8年6月のデータ〉

6月下旬 までのデータ

泉佐野	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				17	63	110	123	88	194															
平年値				6	16	19	30	47	42	58	58	63	59	95	88	82	135	195	190	135	96	37	25	11

