


〈令和8年8月のデータ〉

コナガ フェロモントラップ


蛾のオス成虫がメス成虫の出す性フェロモンに誘引される特徴を利用して発生量を調査しています。
誘殺虫数が平年より著しく増加した場合、その後に幼虫が多発して被害を受けることがあります。
コナガは、キャベツなどあぶらな科野菜全般を加害します。

<調査地点>羽曳野市、枚方市、富田林市、堺市、泉佐野市
誘殺虫数(旬別) ※縦軸の目盛りはグラフごとに異なりますのでご注意ください。

8月下旬 までのデータ																								
羽曳野	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8	0	0	1	1	3	6	7	1	0	2	0	3	0	0	1									
平年値	0	3	2	4	5	6	10	8	6	4	1	1	0	0	0	0	0	10	1	0	1	1	1	1




8月下旬 までのデータ																								
枚方	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				0	1	15	8	7	7	4	2	3	0	0	0									
平年値				9	14	12	13	19	21	16	5	4	4	4	13	4	1	1	1	2	1	2	2	1



〈令和8年8月のデータ〉


8月下旬 までのデータ

富田林	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0									
平年値				1	1	3	3	2	1	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1



8月下旬 までのデータ

堺	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				0	1	1	1	0	2	3	3	6	1	2	0									
平年値				12	16	16	13	14	18	11	11	12	6	5	6	8	11	12	8	6	6	4	6	7



8月下旬 までのデータ

泉佐野	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				2	5	5	1	0	2	1	0	0	0	0	0									
平年値				0	4	2	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	2	2

