

〈令和8年8月のデータ〉

オオタバコガ フェロモントラップ

蛾のオス成虫がメス成虫の出す性フェロモンに誘引される特徴を利用して発生量を調査しています。
誘殺虫数が平年より著しく増加した場合、その後に幼虫が多発して被害を受けることがあります。
オオタバコガは、きく、トマト、水なす、キャベツなど野菜・花き類全般を加害します。


※オオタバコガの見分け方については以下の資料も参考にしてください。

[ヨトウムシ類の見分け方と防除](#)

<調査地点>羽曳野市、枚方市、八尾市、富田林市、岸和田市、泉佐野市
誘殺虫数(旬別) ※縦軸の目盛りはグラフごとに異なりますのでご注意ください。


8月下旬 までのデータ

羽曳野	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8	0	16	34	44	36	25	43	100	159	72	29	40	34	10	38									
平年値	0	1	6	17	15	12	4	14	53	45	37	38	28	22	24	29	39	65	87	84	61	27	15	3



8月下旬 までのデータ


枚方	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				12	42	56	47	45	89	61	54	95	86	48	81									
平年値				4	5	4	2	6	13	18	9	11	14	11	14	18	13	29	31	29	21	14	12	2



〈令和8年8月のデータ〉


8月下旬 までのデータ

八尾	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				12	42	48	55	106	116	88	33	80	65	57	74									
平年値				6	34	19	11	39	78	89	64	83	82	60	56	57	66	75	80	77	77	30	40	14




8月下旬 までのデータ

富田林	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				4	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	4									
平年値				3	3	3	4	2	2	3	1	1	2	3	1	2	3	3	14	6	5	2	1	1



8月下旬 までのデータ

岸和田	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				37	97	11	92	58	111	76	26	30	31	41	14									
平年値				31	38	27	18	30	59	64	48	47	37	30	26	36	41	55	73	85	94	73	44	23



〈令和8年8月のデータ〉

8月下旬 までのデータ

泉佐野	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R8				45	22	13	21	43	138	76	47	74	66	30	22									
平年値				16	20	14	8	38	80	88	62	68	69	57	50	63	74	80	89	87	104	69	41	19

