

表 2-21 降下ばいじん総量（年平均値）の推移

（単位：トン／月／㎤）

| 年度<br>地区 | 46    | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 備 考                  |
|----------|-------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 池田市      | 5.48  | 2.45 | 2.59 | 2.14 | 2.11 | 2.18 | 池田保健所                |
| 豊中市      | 6.09  | 2.28 | 2.01 | 1.96 | 2.02 | 2.69 | 豊中保健所                |
| 吹田市      | 7.35  | 3.24 | 2.90 | 2.90 | 2.93 | 3.22 | 吹田保健所                |
| 大阪市      | 8.49  | 4.77 | 3.94 | 3.76 | 3.54 | 3.80 | 公害監視センター             |
| 守口市      | 6.60  | 2.74 | 2.65 | 2.97 | 2.83 | 2.09 | 守口保健所                |
| 東大阪市     | 7.83  | 2.85 | 2.90 | 2.83 | 2.26 | 2.48 | 東大阪市西保健所<br>（旧布施保健所） |
| 八尾市      | 10.23 | 4.02 | 3.12 | 3.01 | 3.38 | 3.13 | 八尾保健所                |
| 松原市      | 6.79  | 3.95 | 3.58 | 3.11 | 2.85 | 3.02 | 大阪薬科大学               |
| 富田林市     | 4.08  | 2.17 | 1.98 | 2.06 | 2.33 | 2.23 | 富田林保健所               |

（注）ダストジャーによる測定である。