



CPR基本プロトコル(案)



- * 1 大声で呼びかけあるいは肩をたたいても何らかの応答や目的のある仕草がなければ反応なしとみなす。
- * 2 気道確保と脈拍触知を同時に行っても良い。
- * 3 10秒以内で判断。
脈拍の確認は、成人、小児では頸動脈等、乳児、新生児では上腕動脈又は大腿動脈等で行う。
脈拍の有無に自信がもてないときは、呼吸の観察に基づいて胸骨圧迫を開始する。
小児、乳児、新生児の場合、10回/分未満の徐呼吸は正常な呼吸ではないと判断する。
小児、乳児、新生児の場合、十分な酸素投与や人工呼吸にもかかわらず、心拍数が60回/分未満でかつ循環が悪い場合は胸骨圧迫を開始する。
- * 4 心停止と判断した場合、胸骨圧迫を開始するとともに心電図モニター・除細動器を装着し、準備が整い次第リズムチェックを行い、ショック適応の波形であれば、可能な限り早期の段階でショックを実施する。
- * 5 目前での心停止や有効な人工呼吸を伴う心肺蘇生から引き継ぐ場合には、初回の人工呼吸は30回の胸骨圧迫の後に行う。それ以外の場合には、人工呼吸の準備が整い次第実施する。以降、胸骨圧迫と人工呼吸を30:2で行う。
- * 6 リズムチェックとは、心電図の波形確認を行うとともに、必要に応じて脈拍の確認を行うことをいう。
- * 7 小児、乳児、新生児に対して二人で実施する場合は15:2とする。
- * 8 新生児仮死に対して二人で実施する場合は3:1とする。
- * 9 胸骨圧迫は、可能な限り中断することなく実施する。
- * 10 全年齢を対象とする。未就学児までには未就学児用パッドもしくは未就学児用モードを備えている場合は、それを使用する。ない場合は、小学生～大人用パッドを代用する。
- * 11 ショックを2回実施しても、ショック適応波形が継続する状態を難治性VFとし、ECPR対応医療機関への搬送を考慮する。


本プロトコルはいわゆる「半自動式除細動器」の使用を前提としている。その他の機種については地域MC協議会で手順等を確認しておくことが望ましい。なお、本プロトコルに準じ活動中、心肺蘇生等を望まない可能性があることを救急隊が知り得た場合は、別に示す「人生会議(ACP)に基づく心肺蘇生等を望まない心肺停止傷病者に対する救急隊の活動要領」に移行することとする(救急隊側から積極的に傷病者の意思等を確認する必要はない)。

気管挿管の Protocol (案)



- * 1 本 Protokol の適応は、成人で心臓機能停止、かつ呼吸機能停止であるものとする。
- * 2 気管挿管のために電気ショックの実施が遅れてはならない。
- * 3 胸骨圧迫は、可能な限り中断することなく実施し、やむを得ない場合でも10秒以内の中断にとどめる。
- * 4 視診、聴診による観察所見とあわせて、呼気CO₂モニタを有する場合は(連続)監視を行う。呼気CO₂モニタが無ければ器具を用いた確認を併用する。* 5 気管内チューブの位置に確信がもてない場合は喉頭鏡で再度展開し、気管内チューブが声門を通過しているか確認する。
- * 6 必要に応じて再度オンラインMCにより指示を受ける。
- * 7 胸骨圧迫は中断なく行い、人工呼吸と同期させない。
- * 8 適切な換気が可能であれば、胸骨圧迫と人工呼吸は同期させない。

静脈路確保・薬剤投与の Protocol (案)



- * 1 早期にアドレナリン投与を実施するため、静脈路確保及びアドレナリン投与の一括指示要請を可能とする。ただし、4回目以降はオンラインMCにより指示を受ける。
- * 2 アドレナリン投与の適応は、およそ8歳以上かつ
 1. VF/pulselessVT
 2. PEA
 3. 心停止に陥ってからの時間が短時間であると推測できるAsystoleのいずれかを満たすものとする。
- * 3 リズムチェックとは、心電図の波形確認を行うとともに、必要に応じて脈拍の確認を行うことをいう。
- * 4 薬剤漏れがあった場合は、静脈路の再確保は行わない。
- * 5 VF/pulselessVTに対しては、アドレナリン投与直前または直後に電気ショック1回を実施する。アドレナリン投与のために電気ショックが遅れてはならない。電気ショックの直後にアドレナリンを投与する場合、再度のリズムチェックは行わない。
- * 6 心停止前に静脈路確保が完了した傷病者が心停止になった場合、ショック適応リズムであれば、電気ショックを実施する。アドレナリン投与は、ショック実施直後ではなく、2分後に行う。
- * 7 適切な換気が可能であれば、胸骨圧迫と人工呼吸は同期させない。
- * 8 本Protocol適用前に静脈路確保が完了している場合、オンラインMCによりアドレナリン投与の指示を受けること。