

Kinakailangang malaman tungkol sa TB




©2014 大阪府もずやん

☆Sa pagiging malayo sa iyong sariling bansa ay nagdudulot ng stress dahil sa pagbabago ng kapaligiran at wika. Bumababa ang resistensya kapag nakakaranas ng stress. **Ang mababang resistensya ay nagdaragdag ng panganib na magkaroon ng tuberculosis.** Huwag abusuhin ang sarili, Huwag mag atubili na kumunsulta sa tauhan ng Management Organization o training center staff kapag masama ang pakiramdam.


Ang kalagayan ng mga pasyente ng TB mula sa ibang bansa.

<Bilang ng mga bagong rehistradong dayuhang pasyente ng TB/porsyento ayon sa pangkat ng edad, Taon 2022>




Halos 50% ay nasa pagitan ng 20~29 ang edad, karamihan sa kabataan!

<Mga pasyente ng tuberculosis na ipinanganak sa ibang bansa, ayon sa bansang sinilangan, Taon 2022>



Karamihan ay galing sa bansa ng Asya!

<Porsyento ng mga dayuhang pasyente ng TB ayon sa pagpasok sa bansa/porsyento ayon sa pangkat ng edad, Taon 2022>



Sa kabataang wala pang 20 taong gulang, higit sa kalahati ang nagkakasakit sa loob ng 5 taon pagkapasok sa Japan!

□ Pumasok sa Japan 5 taon na ang nakalilipas / Di alam ang eksaktong petsa
■ Pumasok sa Japan sa loob ng 5 taon

Ang tuberculosis ay...



Hindi lahat ng nahawahan ay magkakasakit.

- Nakakahawa ito kapag ang pasyente na may Pulmonary TB ay umubo o bumahing at nasinghot ang tuberculosis bacteria sa pamamagitan ng tilamsik sa hangin. (Droplet Infection)
- Ang impeksyon ay nangangahulugan na ang TB bacteria ay nasa loob ng katawan ngunit ito ay natutulog.
- Ang pagkakasakit ay ang kondisyon kapag ang TB bacteria sa katawan ay dumami.


[Pangunahing sintomas]



ubo/
plema



sinat



pagkapagod



walang
ganang
kumain

[Iba pang sintomas] Sa ngayon, Pinagpapawisan sa gabi, pagbagsak ng timbang at iba pa

©Ang mga pangunahing sintomas ay kahawig ng trangkaso gaya ng nakasulat sa taas, Ang katangian nito ay tumatagal ang sintomas ng mahabang panahon. Kumunsulta sa Management Organization o sa Training center staff kapag ang sintomas ay umabot ng mahigit sa 2 linggo.

Ang tungkol sa paggamot



Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot!

- ©Kapag ikaw ay nasuri na may tuberculosis, Iinom ng iba't ibang klase ng gamot sa loob ng 6 hanggang 8 buwan.
- ※Maaring tumagal ito depende sa sintomas at pagsulong.
- ©Mahalaga na ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot hanggang matapos ang gamutan.

Tungkol sa Sistema

- ©Tungkol sa mga gastos sa paggamot sa tuberculosis, ang pambansa at lokal na pamahalaan ay nagbibigay ng mga subsidy o pinansyal na tulong mula sa gobyerno para sa mga gastos sa pagpapagamot sa ilalim ng Infectious Disease Control Law.
- ©Kung kinakailangan ay maaaring magpatawag ng interpreter kapag nahihirapan ipaliwanag sa Japanese.

Tungkol sa pagpuksa

- (1) tamang pag-eehersisyo
- (2) kasapatan sa pagtulog
- (3) balanseng pagkain
- (4) hindi paninigarilyo
- (5) Magpamedical examination sa iyong pinagtatrabahuhan (kabilang ang chest X-ray)



- ☆Ang pagtuklas ng maaga / maagang pagpacheck up ay mahalaga.
- ☆Maaari pumasok sa trabaho o paaralan habang umiinom ng gamot kung ito ay walang potensyal na magkalat ng impeksyon!
- ☆Ang Public Health Center ay magbibigay ng suporta sa oras na ikaw ay madiagnose ng tuberculosis!



Pinagmulan: Tuberculosis Prevention Society
Nilikha ng Osaka Prefecture Izumisano Health Center