

麻しん患者の接触者の方へ

○麻しんウイルスは感染力がとても強く、37.5℃以上の発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹などの症状がでて、まれに肺炎や脳炎等の合併症を発症することもあります。

○感染していた場合、患者との接触日から **10～12 日後(最長 21 日)**頃に症状が現れる可能性があります。



接触者の方へお願い

- ✓ **最終接触日から 21 日間**体調を確認をしてください。毎日**体温**を測ってください。



- ✓ 母子健康手帳などで**ワクチン接種歴**の確認をしてください。



※定期接種:麻しん風しん混合ワクチン(MR ワクチン)を1歳と小学校に上がる前の合計2回接種します。

- ✓ **健康観察期間中はなるべく不要不急の外出を控えてください。**


外出時は**マスク**を着用してください。



症状がでたときは

- ✓ 医療機関に**電話**をして、**麻しんの可能性**があることを伝え、**病院の指示に従って受診**してください。

藤井寺保健所にもご連絡ください。



- ✓ **できる限り公共交通機関の利用は控えてください。**



- ✓ **マスク**を着用してください。



参考資料

- ◆ 保健所における麻しん対策・対応ガイドライン第三版
— 国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 応用疫学研究センター

大阪府藤井寺保健所

〒583-0024 大阪府藤井寺市藤井寺1丁目8番36号

TEL:072-955-4181

FAX:072-939-6479

麻しん接触者健康観察票

麻しん患者との最終接触日時： 年 月 日 時ごろ

★ **症状が出た場合**は、医療機関へ電話で必ず麻しんの可能性があることを伝えて相談をしてください。

最終接触より	日付	測定時間	体温	症状（○をつける）
0日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
1日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
2日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
3日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
4日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
5日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
6日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
7日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
8日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
9日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
10日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
11日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
12日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
13日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
14日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
15日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
16日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
17日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
18日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
19日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
20日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】
21日		:	. °C	なし・あり【発熱・咳・鼻水・目の充血・発疹・その他()】

MEMO

保健所からの連絡

大阪府藤井寺保健所

〒583-0024

大阪府藤井寺市藤井寺1丁目8番36号

TEL:072-955-4181

FAX:072-939-6479