

令和7年7月

南河内農と緑の総合事務所

農の普及課 発行

思いつきり！！南河内

# 果樹栽培技術情報



南河内フルーツ


農家のみなさまへ、本号より果樹栽培技術情報の発信を開始します！



## 成熟を早める！ ～いちじくの「エスレル処理」～

大阪府は全国第3位のいちじく産地であり、特に南河内地域で盛んに生産されています。

通常、いちじくは着果後 75～80 日で成熟しますが、果実の先端に植物油を塗布すると、エチレンの合成が促され、7～10 日程度成熟が早まります。この技術は紀元前3世紀のギリシャですでに利用されていました。現在では、処理が簡単で果実に油斑が残らないことから、植物油の代わりに植物成長調整剤「エスレル」が使用されています。エスレルを規定の倍率に水で希釈し、果実の先端にハンドスプレー等で吹きかけることで、処理後約6日で成熟します。これにより、収穫時期を調整し、早期出荷や労力の分散、台風や秋雨による気象リスクの回避が可能となります。処理の適切な時期は自然成熟の約15日前であり、柵井ドーフィンであれば「果皮が黄色みを帯び、果頂部の目が桃色から赤色に変化する頃」が目安（右記写真参照）となります。一方で、処理時期が早すぎると果実の内部が未熟でも着色してしまい、品質低下へと繋がるため注意が必要です。また、収穫労力の集中や養分の競合による果実肥大の抑制、糖度の低下を防ぐため、1回のエスレル処理は結果枝当り果実2個以内に抑えましょう。



エスレル処理適期果 エスレル処理失敗果

| エスレル 10<br>(15%液剤)<br>登録内容 | 登録内容 | 使用目的 | 希釈倍数            | 使用時期     | 使用回数   | 使用方法           |
|----------------------------|------|------|-----------------|----------|--------|----------------|
|                            | いちじく | 熟期促進 | 500～<br>1,000 倍 | 成熟予定15日前 | 1果当り1回 | 果面散布（果実が濡れる程度） |



## 暑さに負けるな！！期待されるぶどう品種ご紹介

ぶどう農家や関係者による昨年の品種検討会の集計結果と近年の温暖化による着色不良の発生を踏まえて、今後期待されるおすすめの品種を3つ紹介します！！

### グロースクローネ

おすすめ度：★★★★☆

極大粒（18～23g）。夏季の気温が高い西南暖地における着色が巨峰やピオーネよりも濃紫黒色になることから、着色不良が問題となっている地域での普及が期待されます！味は巨峰よりも酸味が少なく甘く、フォクシーな香りが良い◎



### クイーンセブン

おすすめ度：★★★★☆

中粒（8～10g）。栽培・収穫時期が早いため、着色不良が起きにくい。しかし、果粒が密着粒となるため、摘粒作業に負担が掛かる。糖度が高く、世界一甘いぶどうと言われるほど甘みが強い。



### マスカサーティーン

おすすめ度：★★★★☆

大粒（12～15g）。シャインマスカットの栽培方法とほとんど同じでよい◎熟すと透明感があり、シャインマスカットより皮ごと食べやすく、味は爽やか。収穫時期はシャインマスカットより少し遅い。



大阪府 南河内農と緑の総合事務所 農の普及課

〒584-0031 富田林市寿町2-6-1 南河内府民センター内

TEL0721(25)1131（代表） FAX0721(25)0425

メール: minamikawachinotomidori-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

ホームページ: [https://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m\\_index/index.html](https://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_index/index.html)

令和7年7月発行



事務所 HP



バックナンバー

# 南河内普及だより

松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村

## 南河内地域の鳥獣被害状況を知り、効果的な対策を！！

R5 年度南河内地域における主要鳥獣被害の獣種別割合は、アライグマ 30%、カラス 29.3%、イノシシ 24.2%、ムクドリ 16.5%でした。被害防止には複数手段の組合せと継続的な取組が重要です。以下を参考に鳥獣被害対策を実施しましょう。

### ○鳥類対策

防鳥網の設置が最も確実です。防鳥網を使用する際には対象種が通り抜けられない目合いの網を使用することが必須で、目安としてカラスは 75mm 以下、ヒヨドリやムクドリは 30mm 以下、スズメは 20mm 以下です。



← 詳細は二次元コードから。  
鳥害対策（農研機構）



← 野生鳥獣による被害防止  
マニュアル（農林水産省）

### ○獣類対策

獣種によって侵入行動にパターンがあり、大きく「掘る」「登る」「破く」に分けられます。パターンに合わせた対策を行いましょう。

## ⚠ 暑さに注意！熱中症対策 ⚠

今年 6 月より全ての事業者は下記対策を実施するよう、罰則付きで義務化されました。熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、熱中症の自覚症状がある作業者を①報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること、②作業からの離脱、③身体のコリ、④必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせられるようにすること等です。

また日々の健康管理も重要です。詳しくは以下の二次元コード等をご参照ください。



← 職場における熱中症予防情報  
（厚生労働省）



← 熱中症対策アイテム集  
（農林水産省）



## 肥料価格高騰等に対する支援制度について

肥料価格高騰等により、生産コストが増加している農業者を対象とし、大阪府肥料価格高騰対策支援金を支給します。

### 【対象者】

大阪府に在住で、農業の売上が 100 万円以上の農業者

※令和 6 年度の確定申告額等

詳細は二次元コードから→



### 【支援金額】販売区分ごとに支給

| 販売金額                  | 支給額   | 販売金額          | 支給額    |
|-----------------------|-------|---------------|--------|
| 100 万円以上～500 万円未満     | 1 万円  | 1 億円以上～2 億円未満 | 50 万円  |
| 500 万円以上～1,000 万円未満   | 3 万円  | 2 億円以上～3 億円未満 | 90 万円  |
| 1,000 万円以上～3,000 万円未満 | 7 万円  | 3 億円以上～5 億円未満 | 100 万円 |
| 3,000 万円以上～5,000 万円未満 | 10 万円 | 5 億円以上        | 200 万円 |
| 5,000 万円以上～1 億円未満     | 30 万円 |               |        |

### 【申請方法・期間】

- ・大阪府行政オンラインシステム、郵送
- ・令和 7 年 7 月 1 日（火）～8 月 31 日（日）



普及だより俳壇

ひそやかな衣擦れを聞く袋掛



大阪府 南河内農と緑の総合事務所 農の普及課

令和 7 年 7 月発行 第 210 号

〒584-0031 富田林市寿町 2-6-1 南河内府民センター内

TEL0721(25)1131（代表）FAX0721(25)0425

メール: minamikawachinotomidori-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp



事務所 HP



バックナンバー