令和８年11月４日まで農政局、都道府県担当者及び防除担当者限り

令和８年 10 月２日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和８年 11 月４日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名	変更内容
第 19184 号	コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	ＢＡＳＦジャパン株式会社	別紙１
第 19185 号	クミアイコテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	クミアイ化学工業株式会社	別紙２
第 19186 号	日曹コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	日本曹達株式会社	別紙３

【 申請者による変更理由 】
新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果から現登録の維持は困難と判断し、登録変更をすることとしたため。

【 本文書の取扱いに関するお願い 】
本周知文書は、変更登録内容を防除指針、防除暦等へ速やかに反映するための情報提供を目的としています。このため、農薬登録日以前においては、本情報を必要に応じて防除指針、防除暦等に関係する生産者団体等に提供することは問題ございませんが、インターネット上に掲載する等、変更内容を公開することはお控えください。なお、登録後の掲載は問題ございません。

【本件のお問い合わせ先】
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

TEL:03-3502-5969
FAX:03-3501-3774

令和８年11月４日まで農政局、都道府県担当者及び防除担当者限り
（別紙１）

コテツフロアブル

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」に変更する。
- 作物名「だいこん」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更し、本剤の使用回数及びクロルフェナピルを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「1回」に変更する。
- 作物名「なばな類」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- 作物名「非結球はくさい」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」に変更する。
- 作物名「非結球メキャベツ」の使用時期を「収穫７日前まで」から「収穫14日前まで」に変更し、本剤の使用回数及びクロルフェナピルを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「1回」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙを含む農薬の総使用回数
りんご	ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ、ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ、ﾊﾏｷﾑｼ類、ﾐﾉｶﾞ類	2000 倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
	ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ、ﾘﾝｺﾞｻﾋﾞﾀﾞﾆ	2000～4000 倍					
だいこん	ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、ﾀﾞｲｺﾝｻﾙﾊﾑｼ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前まで			
なばな類	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ			収穫 3 日前まで			
非結球はくさい	ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ			収穫 3 日前まで			
非結球メキャベツ	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ			収穫 7 日前まで			

［変 更 後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙを含む農薬の総使用回数
りんご	ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ、ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ、ﾊﾏｷﾑｼ類、ﾐﾉｶﾞ類	2000 倍	200～700 L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ、ﾘﾝｺﾞｻﾋﾞﾀﾞﾆ	2000～4000 倍					
だいこん	ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、ﾀﾞｲｺﾝｻﾙﾊﾑｼ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 21 日前まで	1 回		1 回
なばな類	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ			収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内
非結球はくさい	ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ			収穫 14 日前まで			
非結球メキャベツ	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ				1 回		1 回

令和８年11月４日まで農政局、都道府県担当者及び防除担当者限り
（別紙２）

クミアイコテツフロアブル

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」に変更する。
- 作物名「だいこん」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更し、本剤の使用回数及びクロルフェナピルを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「1回」に変更する。
- 作物名「なばな類」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- 作物名「非結球はくさい」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」に変更する。
- 作物名「非結球メキャベツ」の使用時期を「収穫７日前まで」から「収穫14日前まで」に変更し、本剤の使用回数及びクロルフェナピルを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「1回」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙを含む農薬の総使用回数
りんご	ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ、ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ、ﾊﾏｷﾑｼ類、ﾐﾉｶﾞ類	2000 倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
	ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ、ﾘﾝｺﾞｻﾋﾞﾀﾞﾆ	2000～4000 倍					
だいこん	ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、ﾀﾞｲｺﾝｻﾙﾊﾑｼ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前まで			
なばな類	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ			収穫 3 日前まで			
非結球はくさい	ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ			収穫 3 日前まで			
非結球メキャベツ	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ			収穫 7 日前まで			

［変 更 後］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙを含む農薬の総使用回数
りんご	ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ、ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ、ﾊﾏｷﾑｼ類、ﾐﾉｶﾞ類	2000 倍	200～700 L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ、ﾘﾝｺﾞｻﾋﾞﾀﾞﾆ	2000～4000 倍					
だいこん	ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、ﾀﾞｲｺﾝｻﾙﾊﾑｼ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 21 日前まで	1 回		1 回
なばな類	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ			収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内
非結球はくさい	ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ			収穫 14 日前まで			
非結球メキャベツ	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ				1 回		1 回

令和８年11月４日まで農政局、都道府県担当者及び防除担当者限り
（別紙３）

日曹コテツフロアブル

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」に変更する。
- 作物名「だいこん」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更し、本剤の使用回数及びクロルフェナピルを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「1回」に変更する。
- 作物名「なばな類」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- 作物名「非結球はくさい」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」に変更する。
- 作物名「非結球メキャベツ」の使用時期を「収穫７日前まで」から「収穫14日前まで」に変更し、本剤の使用回数及びクロルフェナピルを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「1回」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

［変 更 前］

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の使用回数</th><th>使用方法</th><th>ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙを含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">りんご</td><td>ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ、ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ、ﾊﾏｷﾑｼ類、ﾐﾉｶﾞ類</td><td>2000 倍</td><td rowspan="2">200～700 L/10a</td><td rowspan="2">収穫前日まで</td><td rowspan="6">2 回以内</td><td rowspan="6">散布</td><td rowspan="6">2 回以内</td></tr>
<tr><td>ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ、ﾘﾝｺﾞｻﾋﾞﾀﾞﾆ</td><td>2000～4000 倍</td></tr>
<tr><td>だいこん</td><td>ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、ﾀﾞｲｺﾝｻﾙﾊﾑｼ</td><td rowspan="4">2000 倍</td><td rowspan="4">100～300 L/10a</td><td>収穫 14 日前まで</td></tr>
<tr><td>なばな類</td><td>ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td><td>収穫 3 日前まで</td></tr>
<tr><td>非結球はくさい</td><td>ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ</td><td>収穫 3 日前まで</td></tr>
<tr><td>非結球メキャベツ</td><td>ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td><td>収穫 7 日前まで</td></tr>
</table>

［変 更 後］

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の使用回数</th><th>使用方法</th><th>ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙを含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">りんご</td><td>ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ、ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ、ﾊﾏｷﾑｼ類、ﾐﾉｶﾞ類</td><td>2000 倍</td><td rowspan="2">200～700 L/10a</td><td rowspan="2">収穫 3 日前まで</td><td rowspan="2">2 回以内</td><td rowspan="6">散布</td><td rowspan="2">2 回以内</td></tr>
<tr><td>ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ、ﾘﾝｺﾞｻﾋﾞﾀﾞﾆ</td><td>2000～4000 倍</td></tr>
<tr><td>だいこん</td><td>ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、ﾀﾞｲｺﾝｻﾙﾊﾑｼ</td><td rowspan="4">2000 倍</td><td rowspan="4">100～300 L/10a</td><td>収穫 21 日前まで</td><td>1 回</td><td>1 回</td></tr>
<tr><td>なばな類</td><td>ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td><td>収穫 7 日前まで</td><td rowspan="2">2 回以内</td><td rowspan="2">2 回以内</td></tr>
<tr><td>非結球はくさい</td><td>ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ</td><td rowspan="2">収穫 14 日前まで</td></tr>
<tr><td>非結球メキャベツ</td><td>ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td><td>1 回</td><td>1 回</td></tr>
</table>